

EL CÉSPED DEL VECINO ES MÁS VERDE: FLORA DE PATIOS A TRAVÉS DE UN GRADIENTE SOCIAL

Fábio Angeoletto*

Juan Pedro Ruiz Sanz**

Frederico Fonseca da Silva***

Ricardo Massulo Albertin****

Aline Pradeiczuk*****

Camila Sabadin*****

RESUMEN: Patios urbanos tienen un potencial considerable para la conservación de la biodiversidad y refuerzo de la seguridad alimentaria. Sin embargo, estos espacios no están bien planificados, existe poca información sobre la diversidad de la flora presente en los patios de las diferentes clases sociales. Hemos cuantificado y comparado la diversidad vegetal de los patios de dos barrios de la región metropolitana de Maringá, mediante el cálculo de índices de diversidad, correlaciones bivariadas y del potencial de plantíos, y trazamos directrices de planificación, con el objetivo de aumentar la presencia de la vegetación arbórea, fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir a la conservación de la diversidad biológica, incluyéndose la preservación de especies de plantas en peligro de extinción.

PALABRAS CLAVE: Biodiversidad; Ecología Urbana; Patios; Seguridad Alimentaria.

THE GRASS IS ALWAYS GREENER ON THE OTHER SIDE OF THE FENCE: FLORA OF BACKYARDS THROUGH A SOCIAL GRADIENT

ABSTRACT: Urban backyards have considerable potential for biodiversity conservation and the enhancement of food security. However, these spaces are poorly planned, there is little information on the diversity of flora present in the

* Grupo de estudios en ecología humana, urbana y del paisaje de la Universidad Autónoma de Madrid; Univ. Autónoma de Madrid, España y Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil; E-mail: fabio_angeoletto@yahoo.es

** Grupo de estudios en ecología humana, urbana y del paisaje de la Universidad Autónoma de Madrid, España y Doctorado en Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.

*** Profesor y investigador del instituto Federal do Paraná, Curitiba, (PR), Brasil.

**** Doctorando en geografía por la Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá, (PR), Brasil.

***** Estudiante de Biología en la Universidade Comunitária da Região de Chapecó, (SC), Brasil

***** Estudiante de Agronomía en la Universidade Comunitária da Região de Chapecó, (SC), Brasil

backyards of different social clases. We quantified and compared plant diversity of the backyards of two neighborhoods in the metropolitan area of Maringa, by calculating diversity indices, bivariate correlations, the planting potencial, and outline planning guidelines, with the goal of increasing the presence of woody vegetation, strengthen the food security and contribute to the conservation of biological diversity, including the preservation of endangered plant species.

KEY WORDS: Urban Ecology, Backyards, Biodiversity, Food Security

Zeus, el hijo de Crono, estrechó en sus brazos a Hera, su esposa. La divina tierra produjo verde hierba, loto fresco, azafrán y jacinto espeso y tierno para levantarlos del suelo. Acostáronse allí y cubriéronse con una hermosa nube dorada, de la cual caían lucientes gotas de rocío.
Iliada. Homero, siglo VIII a.C.

INTRODUCCIÓN

En 2007 la población urbana mundial superó la barrera del 50%, alcanzando en América Latina y el Caribe el 79%. El conjunto de impactos causados por la masiva urbanización mundial, en escala local, regional y global, es tajante (PICKETT, 1997; ANGEOLETTO, 2012). Según Vitousek (1994), la constante conversión de suelos en cultivos y ciudades es uno de los tres mayores impactos ambientales globales de origen humana, además de las crecientes concentraciones de CO₂ en la atmósfera, y de otros cambios en los ciclos biogeoquímicos. En las próximas décadas, la urbanización será el impacto humano globalmente más significativo, principalmente en los trópicos, si profundos cambios en políticas y planificación de los usos de suelo no ocurrieren (CHAPIN III, et al., 2000; ANGEOLETTO, 2008).

En Brasil, el proceso de urbanización resultó en un desplazamiento de millones de personas desde las zonas rurales hacia las ciudades. En 1890 la población urbana de Brasil era cerca de 10%. En pocas décadas, ese cuadro se invierte: hoy, 83% de los brasileños viven en ciudades. En un primer ciclo, los emigrantes se han desplazado hacia las ciudades grandes. Desde mediados de los años 90, se inicia un según ciclo de urbanización en Brasil, con un aumento considerable del número de

ciudades medias (con poblaciones entre 100.000 y 500.000 habitantes), de personas viviendo en ellas y del área ocupada por ellas (CARVALHO, 2003; ANGEOLETTO, 2012).

Entre 2000 y 2010, esa expansión se mantuvo: mientras que ciudades pequeñas y grandes crecieron a tasas anuales semejantes (1,06% y 1,07%, respectivamente), las ciudades medias brasileñas crecieron 1,51% al año. Actualmente hay 283 ciudades medias en Brasil, que conjunto concentran aproximadamente el 25% de la población brasileña (IPEA, 2011). Las tendencias actuales de la urbanización brasileña reflejan un fenómeno global. Contrariamente a la creencia general, el grueso del aumento de la población urbana mundial ocurre en ciudades medianas y pequeñas, cuyas capacidades de planificación y gestión generalmente son débiles (UNFPA, 2007).

Por razones históricas, la biología de la conservación ha dividido el mundo en hábitats prístinos y degradados. No obstante, hace falta un cambio de mentalidades: la biología de la conservación debe volverse a los hábitats donde viven los seres humanos, y producir conocimiento sobre cómo dividir esos ambientes antropogénicos con especies silvestres (ROSENZWEIG, 2001). De hecho, aunque el porcentual de áreas protegidas esté aumentando mundialmente desde 1990, el número de especies amenazadas sigue creciendo (PNUMA, 2011), hechos que ponen de relieve la urgencia del desarrollo de mecanismos adicionales de conservación biológica.

Con relación al panorama de la urbanización brasileña, urge que se desarrollen investigaciones sobre la ecología de las ciudades medias de Brasil, con el objetivo de auxiliar al establecimiento de políticas ambientales urbanas más exitosas en la protección de la biodiversidad, y en el incremento de la calidad de vida de la gente. En los patios urbanos, los objetivos de disminución de los impactos ambientales urbanos y de conservación de la diversidad biológica coinciden. La definición del término patios es variable en la literatura técnica. Gaston et al. (2005) los definen como espacios privados adyacentes a las viviendas, y que pueden contener, en grados variados, céspedes, polígonos con vegetación ornamental y alimentaria, fuentes de agua, caminos, y a veces construcciones temporarias, como invernaderos. O, sencillamente, se puede caracterizarlos como “el área que ha quedado después de construida la vivienda, en un lote particular” (SMITH, et al., 2006b), definición que hemos adoptado para nuestro estudio.

Aunque los patios sean aparentemente demasiado diminutos para que resulten biológicamente significativos, cuando sumados alcanzan un área de dimensión contundente (GASTON, et al., 2005; DANIELS; KIRKPATRICK, 2006; LORAM, et al., 2007; MARCO, et al., 2008). De cierto, el área ocupada por los patios en los ecosistemas urbanos suele ser tajante. En la ciudad de Dayton, EEUU, el 19,5% de su área está ocupada por patios (DANIELS; KIRKPATRICK, 2006). En León (Nicaragua) los patios constituyen el 86,2% de la superficie de áreas verdes urbanas (GONZÁLEZ-GARCÍA; SAL, 2008). El área de céspedes en patios de viviendas en los EEUU está estimada en 16 millones de hectáreas, rebosando largamente cultivos agrícolas económicamente importantes como la cebada (5 millones de hectáreas), algodón (4,5 millones de hectáreas) y arroz (1,1 millón de hectáreas) (ROBBINS, et al., 2001).

Hay un amplio reconocimiento de la importancia de los patios privados a la conservación de la biodiversidad (incluyéndose a preservación de especies amenazadas vegetales y animales), pero prácticamente no ha habido intentos de describir la composición y distribución de la diversidad biológica presente en los patios (GASTON, et al., 2005; THOMPSON, et al., 2005; SMITH, et al., 2006a; LORAM, et al., 2007; ANGEOLETTO, 2008; LORAM, et al., 2008; MARCO, et al., 2008; DAVIES, et al., 2009; GODDARD, et al., 2010; SIVIERO, et al., 2011). Los estudios de la flora urbana en general se concentran en fragmentos de bosques (HOPE, et al., 2003) aunque las especies cultivadas sean las dominantes en los ecosistemas urbanos, y de ellas poco se sepa (MARCO, et al., 2008).

2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 ÁREA DEL ESTUDIO

La región metropolitana de Maringá (RMM) fue creada en 1998 por la Ley Estadual nº 83/98, siendo compuesta por ocho municipios, en área de 2,2 mil Km². Se encuentra localizada a 23°25'38.29"S y 51°56'06.32O. Predominan en la región los latosuelos, principalmente el latosuelo púrpura distrófico. El clima es el subtropical

húmedo mesotermico, con veranos calientes y lluvias concentradas en los meses de verano, pero sin una estación seca definida. La media de temperaturas de los meses más calientes es superior a los 22 °C, y la de los meses más fríos, inferior a 18 °C (ANGEOLETTO, 2012).

Las ciudades brasileñas presentan una elevada heterogeneidad respecto a la clase social predominante en los diferentes barrios. Gradientes urbanos son esencialmente gradientes antropogénicos, producidos como una consecuencia del surgimiento de asentamientos humanos. Por su elevada complejidad, son gradientes indirectos, es decir, no es posible estudiarlos a través de transectos, como se hace en investigaciones de gradientes directos (MCDONNEL; HAHS, 2008; LUBBE, et al., 2010). Por ello, hemos optado por el uso de gradientes sociales, no lineales, abarcando un barrio de baja renta de la ciudad de Sarandi (el *Jardim Universal*), y uno de renta elevada en la ciudad de Maringá (el barrio *Zona 02*). Sarandi (población circa 83.000 habitantes) y Maringá (población circa 357.000 habitantes) son ciudades conurbadas con profundas diferencias de renta y escolaridad entre sus habitantes (ANGEOLETTO, 2012). Este abordaje metodológico posibilita amalgamar datos sociológicos e ecológicos, permitiendo así el discernimiento de estándares de diversidad biológica entre distintas clases sociales, y la producción de informaciones con un gran potencial de aplicación en la gestión y planificación de sistemas ecológicos urbanos (DOW, 2000; GRIMM, et al., 2000; MCDONNEL; HAHS, 2008; LUBBE, et al., 2010).

El barrio Jardim Universal está constituido por 571 viviendas (y por lo tanto, 571 patios), y está poblado por familias de baja renta. En el barrio Zona 02, son 895 viviendas ocupadas mayoritariamente por familias de clase media alta. Fueron sorteadas a través del software Statistica 7 un muestreo aleatorio de 230 viviendas en el Jardim Universal, y 261 viviendas en la Zona 02. El tamaño del muestreo seleccionado ha sido obtenido con un error de estimativa de un 5% y confiabilidad de un 95%. Para los barrios investigados, la tarea de sortear las viviendas fue precedida por una investigación, con mapas en escala 1:2000, para identificar los terrenos baldíos. Identificadas las viviendas sorteadas en los mapas de los barrios, las familias eran visitadas, y utilizamos la técnica de la visita guiada (FLORENTINO, et al., 2007), donde un miembro de la familia era invitado a caminar por los patios,

durante la entrevista, suministrando informaciones específicas sobre los usos de las plantas presentes. Las entrevistas se realizaron tras el entrevistado haber firmado una declaración de consentimiento, en la cual se consentía en participar del estudio y se autorizaba la divulgación de los resultados.

Los usos mencionados por el encuestado eran anotados. Las especies citadas fueron relacionadas en las siguientes categorías de uso: hortícolas, frutales, medicinales, ornamentales. Terminada esa etapa, mensurábamos el área total de los patios, el área solado y el área no solado de los mismos. Todas las especies cultivadas directamente en el suelo eran cuantificadas en relación al número de individuos cultivados. No incluimos en la toma de datos individuos cultivados en macetas. La identificación del material botánico ha sido hecha en campo. Las especies cuya identificación no fue posible en campo fueron clasificadas en nivel de familia, género y especie en el Herbario de la *Universidade Estadual de Maringá*. El sistema taxonómico utilizado fue el APG III (THE ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP, 2009). La nomenclatura de los nombres científicos fue chequeada a través de bases de datos Plantminer (SIVIERO, et al., 2011).

Todas las especies identificadas fueron chequeadas en la página web de la Red List de especies amenazadas de extinción de la Internacional Union for Conservation of Nature - IUCN (<http://www.iucnredlist.org>). Además de chequeadas en la Red List, las especies brasileñas también fueron verificadas en la lista de especies amenazadas producida y publicada en la página web del Ministerio del Medio Ambiente de Brasil (<http://www.mma.gov.br/sitio>), ambas accedidas en julio de 2014.

2.2 MEDIDAS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Para calcular y comparar la diversidad de especies vegetales entre los barrios investigados, cuantificamos la riqueza de especies de los barrios del estudio, destacando las familias con mayor número de especies. También hemos calculado el Índice de Valor de Preferencia, el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, el Índice de Dominancia de Simpson, y el Índice de Similitud de Morisita-Horn. Las fórmulas para los cálculos son las siguientes:

$$\text{Índice de valor de preferencia: } IVP\% = Abu-Rel\% + Fre-Rel\% \quad (1)$$

Donde *Abu-Rel%* es el número de individuos de una especie, dividido por el número total de individuos de todas las especies observadas en cada barrio, multiplicado por 100; y *Fre-Rel%* es el número de viviendas en que una determinada especie ocurre, dividido por el número total de viviendas de la muestra, multiplicado por 100.

El IVP apunta el porcentaje de patios donde ocurre una determinada especie vegetal, además valorando la frecuencia de la especie en los patios. Lo hemos calculado para los conjuntos de plantas hortícolas, frutales, medicinales y ornamentales.

$$\text{Índice de Shannon-Wiener: } H = - \sum (ni / N) \log ni / N \quad (2)$$

Donde *ni* = valor de importancia de cada especie (el número de individuos de cada especie) y *N* = total de los valores de importancia.

$$\text{Índice de Dominancia de Simpson: } S = \sum ni [ni (ni-1) / N (N-1)] \quad (3)$$

Donde *ni* = valor de importancia de cada especie; *N* = total de los valores de importancia de las especies.

A través de testes T de Student, hemos mensurado se las diferencias entre los valores de los Índices de Diversidad de Shannon (H) y Simpson (S) son significativas, para los barrios investigados. El Índice de Diversidad de Shannon-Wiener es usado para caracterizar a diversidad de especies en una muestra. El Índice de Dominancia de Simpson mide el grado en que la comunidad es dominada por una o pocas especies comunes.

El grado de similitud entre la flora de los patios de barrios fue calculada a través del *Índice de Similitud de Morisita-Horn*, de acuerdo con la fórmula:

$$Cmb = 2\sum(ani \cdot bni) / da + db) (aN).(bN) \quad (4)$$

donde aN = número total de individuos del barrio A;

bN = n° total de individuos del bairro B;

ani = n° de individuos de cada especie en el bairro A;

bni = n° de individuos de cada especie em el bairro B;

$da = \sum ani^2 / aN^2$ y $db = \sum bni^2 / bN^2$.

Índices de Similitud de Morisita-Horn superiores a 0,75 apuntan una elevada similitud de especies entre dos áreas investigados, mientras que aquellos inferiores a 0,50 revelan una baja similitud de especies entre dos áreas comparados. Por otro lado, cuanto menor la similitud entre dos muestreos, más elevada será la diversidad *beta* entre ellos.

Con el objetivo de verificar si el área libre (no solado) de los patios influye sobre el número de especies e individuos presentes, fueron calculadas correlaciones bivariadas entre el área libre de los patios y número de especies presentes; entre el área libre de los patios y el número total de individuos cultivados; y entre el área de los patios y el número de árboles cultivados. Con el objetivo de verificar si la *edad* de las viviendas (es decir, el número de años desde que la vivienda ha sido construida) influye sobre el número de especies e individuos presentes en los patios, fueron calculadas correlaciones bivariadas entre el área libre de los patios y número de especies; entre el área libre de los patios y entre el número total de individuos cultivados; el área de los patios y el número de árboles cultivados. Santos (2007) propone tres coeficientes de correlación, para distinguir las correlaciones bivariadas, cuando estas se verifican: *fuerte positiva* ($0,8 \leq r < 1$); *moderada positiva* ($0,5 \leq r < 0,8$); y *flaca positiva* ($0,1 \leq r < 0,5$).

Finalmente, hemos cuantificado el número medio de árboles por patios de los barrios estudiados, y basados en ello, y en el suelo disponible para plantíos (área libre medio de los patios de cada barrio, multiplicado por el número de patios del barrio), hemos estimado el potencial de plantíos para los dos barrios del estudio. Para ese cálculo, hemos desarrollado la ecuación:

$$PP = \{[sd(m^2)/9m^2] - nmap\} \quad (5)$$

Donde: PP = potencial de plantíos;

sd = suelo disponible para plantíos;

y $nmap$ = número medio de árboles por patios, considerándose 9 m² como el área adecuada al crecimiento de un plantón de árbol.

No hemos considerado la vegetación herbácea y arbustiva en la cuantificación de los potenciales de plantíos, porque esos tipos botánicos no son excluyentes. Al contrario, patios con buena cobertura vegetal son aquellos que poseen un estrato herbáceo, seguido de un arbustivo y finalmente, de un arbóreo (ANGEOLETTO, 2012).

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los patios de Jardim Universal presentan área libre medio de 108,3 m², y de 164,4 m² en el barrio Zona 02. En ambos los barrios investigados, verificamos que las variables *número de especies*, *número de individuos* y *número de árboles* se correlacionan al área libre de los patios, y al tiempo de construcción (*edad*) de las viviendas, aunque flacamente (Cuadro 1).

Cuadro 1. Correlaciones bivariadas

Correlación bivariada	Jardim Universal	Zona 02
Área x Número de especies	0,4413, p<0,0001	0,4304, p<0,0001
Área x Número de individuos	0,4789, p<0,0001	0,4229, p<0,0001
Área x Número de árboles	0,4215, p<0,0001	0,4592, p<0,0001
Edad x Número de especies	0,3281, p<0,0001	0,3863, p<0,0001
Edad x Número de individuos	0,1544, p<0,0001	0,1913, p<0,0001
Edad x Número de arboles	0,3716, p<0,0001	0,4009, p<0,0001

Fuente: elaboración propia

Hemos cuantificado 151 especies cultivadas en el Jardim Universal, y 381 especies cultivadas en los patios del barrio Zona 02 (cuadro 2). En el Jardim Universal

las familias más representativas en relación a la diversidad fueron: *Asteraceae*, 13 especies; *Euphorbiaceae*, 7 especies; *Araceae*, 7 especies, y *Myrtaceae*, 6 especies. En la Zona 02, las familias mas representativas en relación a la diversidad fueron: *Araceae* (17 especies); *Asteraceae* (17 especies); *Arecaceae* (14 especies) y *Euphorbiaceae* (13 especies).

La diversidad de especies mensurada por el índice de Shannon-Wiener es más grande (cuadro 3), y significativamente diferente (cuadro 4) en los patios de los vecinos de clase media alta de la Zona 02, cuando comparada a la diversidad de flora encontrada en los patios de los vecinos pobres del Jardim Universal. El bajo índice de dominancia de Simpson (*S*) que hemos calculado, en ambos los barrios, indica una elevada riqueza específica. No hay una diferencia significativa entre los índices de dominancia de Simpson a lo largo del gradiente social investigado (Cuadro 3 y 4).

Cuadro 2. Riqueza de familias, géneros y especies

Barrio	Número de familias	Número de géneros	Número de especies
Jardim Universal	66	137	151
Zona 02	108	278	381

Fuente: elaboración propia

Cuadro 3. Índices de Diversidade de Shannon y de Dominancia de Simpson

Barrio	Índice de Shannon-Wiener (H)	Índice de Dominancia de Simpson (S)
Zona 02	4,61	0,033
Jardim Universal	3,79	0,048

Fuente: elaboración propia

Cuadro 4. Significancia del test-t ($p < 0,05$) para los Índices de Shannon y Simpson

Barrios	(H)	(S)
Zona 02 x Jardim Universal	SIGNIFICATIVO	NO SIGNIFICATIVO

Fuente: elaboración propia

Hemos encontrado en los patios investigados de los dos barrios, especies frutales que o bien no son comercializadas en la región metropolitana de Maringá (como por ejemplo *Campomanesia xanthocarpa*, *Eugenia pyriformis*, *Psidium*

cattleianum, todas con bajos IVP´s), o bien son muy escasamente comercializadas (*Myrciaria cauliflora*), constituyéndose de ese modo en fuentes importantes de germoplasma vegetal y de alimento. Algunas de esas especies poseen IVP´s bastante expresivos, como *Eugenia uniflora* y *Myrciaria cauliflora* (en la Zona 02). Sin embargo, algunas especies, como las frutales *Eugenia jambolana*, *Passiflora alata* y *Spondias purpurea* ocurren apenas en el Jardim Universal (aunque con IVP´s bajos), lo que demuestra que su contribución a la conservación de agrobiodiversidad no es despreciable. Las tres especies con mayores índices de valor de preferencia por usos, están relacionadas en el cuadro 5.

Cuadro 5. Índices de valor de preferencia por usos

Uso y especie	IVP% (Jardim Universal)	IVP% (Zona 02)	Uso y especie
(Hort.) <i>Allium fistulosum</i> L.	36,3	20	<i>Allium fistulosum</i> L. (Hort.)
(Hort.) <i>Arachis hypogaea</i> L.	16,2	12,6	<i>Ocimum basilicum</i> L. (Hort.)
(Hort.) <i>Manihot sculenta</i> C.	15,4	11,4	<i>Mentha piperita</i> L. (Hort.)
(Frutal) <i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	50,4	29	<i>Myrciaria cauliflora</i> (Mart.) O. Berg (Frutal)
(Frutal) <i>Mangifera indica</i> L.	36,2	27,5	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. (Frutal)
(Frutal) <i>Citrus reticulata</i> Blanco	34,3	22,4	<i>Eugenia uniflora</i> L. (Frutal)
(Med.) <i>Coleus barbatus</i> (Andrews) Benth.	15,4	16,1	<i>Coleus barbatus</i> (Andrews) Benth. (Med.)
(Med.) <i>Aloe vera</i> Mill.	14,7	9,9	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf (Med.)
(Med.) <i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw.	8,2	7,6	<i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw. (Med.)
(Orn.) <i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	23,2	48,8	<i>Duranta repens</i> L. (Orn.)
(Orn.) <i>Rosa</i> L.	22,5	35,5	<i>Ixora coccinia</i> L. (Orn.)
(Orn.) <i>Duranta repens</i> L.	22,4	29,5	<i>Dyopsis lutescens</i> (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. (Orn.)

Fuente: elaboración propia

Hemos cuantificado el índice de similitud de especies de Morisita-Horn en 0,481, lo que indica una gran diferencia en las floras cultivadas a lo largo del gradiente social estudiado, y, por lo tanto, una elevada diversidad *beta*, cuando comparadas las floras de las distintas clases sociales. Hemos cuantificado el número medio de árboles en 4,4 árboles por patio en el Jardim Universal y en 5,2 árboles por patio en la Zona 02. Conocido el *potencial de plantíos medio* de los patios (o sea, cuántos árboles más podrían ser introducidas por patio), hemos calculado cuantos árboles frutales podrían ser plantados, de acuerdo con el número de patios de los barrios (cuadro 6).

Cuadro 6. Potenciales de plantíos

Barrio	Área medio (m ²)	Número de patios	Número medio de árboles por patio	Potencial de plantíos de árboles por patio	Potencial de plantíos de árboles - total
Jardim Universal	108,3	571	4,4	7,5	4283
Zona 02	164,4	895	5,2	13,1	11725

Fuente: elaboración propia

Los potenciales de plantíos de árboles frutales en ambos los campos del gradiente social investigado demuestran una posibilidad de refuerzo de la seguridad alimentaria y de conservación de la diversidad biológica, a través de plantíos en los patios, preferencialmente de árboles frutales.

De las especies identificadas en el Jardim Universal y en la Zona 02, nueve están clasificadas como amenazadas de extinción. Dos especies ocurren en los dos barrios analizados: *Araucaria angustifolia* y *Delonix regia*. Las especies amenazadas encontradas en los patios poseen bajos índices de valor de preferencia, excepto *Euterpe edulis*, relativamente diseminada por la Zona 02 (IVP de 9,5%). Esos resultados demuestran, por lo tanto, la viabilidad de los patios de la región metropolitana de Maringá para prácticas de conservación ex-situ de especies vegetales amenazadas de extinción (cuadros 7 y 8).

Cuadro 7. Especies amenazadas de extinción, Jardim Universal

Especie	Índice de Valor de Preferencia
<i>Araucaria angustifolia</i>	1,6
<i>Butia eriospatha</i>	2,4
<i>Delonix regia</i>	2,9

Fuente: elaboración propia

Cuadro 8. Especies amenazadas de extinción, Zona 02

Especie	Índice de Valor de Preferencia
<i>Araucaria angustifolia</i>	1,2
<i>Cupressus macrocarpa</i>	1,6
<i>Delonix regia</i>	0,4
<i>Dicksonia sellowana</i>	2
<i>Euterpe edulis</i>	9,5
<i>Heliconia angusta</i>	2

Fuente: elaboración propia

Indudablemente, el incremento del número de árboles en los patios debe constituirse en el primer objetivo concreto de planificación, por su escala espacial y temporal de beneficios socio-ambientales. Patios con más árboles están positivamente correlacionados a especies de invertebrados (LORAM, et al., 2008), muchos de las cuales son especies polinizadoras. Entonces, ¿hay un área mínimo para garantizar la presencia de una mayor densidad arbórea en esos espacios? Esta es una cuestión en abierto respecto la ecología de los patios (GODDARD, et al., 2010). Mitchell y Handstad (2004) mensuraron en *circa* 167 m² el área crítico para el incremento del número de árboles presentes en patios. Hemos obtenido correlaciones positivas entre el área medio no encementado de los patios del Jardim Universal (108,3 m²), y asimismo en el barrio Zona 02, donde el área medio no encementado de los patios es de 164,4 m².

Sin embargo, Angeoletto (2012) en estudio similar realizado en el barrio *Conjunto Triangulo* (también localizado en la ciudad de Sarandi, región metropolitana de Maringá), verificó no haber correlación entre el área medio de

los patios del barrio, de 70 m², y entre el número de especies presentes, entre el número total de individuos cultivados y entre el número de árboles presentes.

Por ello, recomendamos garantizar, a través de legislación específica, patios con un área mínimo de 110 m² no pavimentado, disponibles a la flora, en la región metropolitana de Maringá. Patios con áreas reducidos usualmente tienen menos árboles, principalmente individuos con doseles superiores a dos metros, lo que puede significar daños económicos, sociales, estéticos y ecológicos (LORAM, et al., 2008).

El número de especies cultivadas, de individuos cultivados e y árboles cultivados se correlacionan positivamente (aunque flacamente) a la *edad* de las viviendas. Esos datos apuntan un incremento de la diversidad vegetal a lo largo del tiempo. No obstante, recomendamos el desarrollo de proyectos de introducción de especies vegetales de usos diversos, de modo a apresurar una mayor riqueza específica en los patios.

Por otro lado, el bajo índice de similitud de especies encontrado, hecho que indica alta diversidad *beta* a lo largo del gradiente social estudiado, debe de ser mantenido a través del incentivo al plantío de especies distintas a las encontradas en los barrios, preferencialmente especies sin ocurrencia en los patios estudiados. Además de conservarse la diversidad *beta*, la introducción de nuevas especies aumentaría el índice de diversidad de Shannon-Wiener, y se evitaría que una o unas pocas especies se tornaran dominantes, disminuyéndose así la posibilidad de invasión biológica por parte de especies vegetales oriundas de los patios urbanos (MARCO, et al., 2008)

La riqueza de especies vegetales en patios urbanos suele ser elevada, aunque corrientemente mal distribuida. Barrios de mayor status socioeconómico normalmente presentan una mayor diversidad vegetal en sus *patios*, porque tienen más recursos para introducir nuevas especies de acuerdo con sus preferencias personales (GROVE, et al., 2006). Además estos patios suelen tener más área disponible a la diversificación vegetal (THOMPSON, et al., 2004), como hemos verificado en nuestra comparación de la diversidad vegetal de patios de barrios de diferentes clases sociales.

De todos modos, la riqueza de especies, en nuestros estudios, tanto entre los pobres cuanto entre los vecinos de clase media alta, sigue un estándar: unas pocas especies de alto índice de valor de preferencia (IVP), es decir, comunes en los patios, seguidas por docenas de otras de bajo IVP, un resultado similar al encontrado por diversos autores (THOMPSON, et al., 2004; SMITH, et al., 2006a; MARCO, et al., 2008). Thompson et al., (2004) describen la vegetación cultivada en un patio como una pequeña muestra de un *pool* potencialmente muy elevado de especies.

Como demuestran nuestros datos, la desigualdad al acceso a la vegetación configura con claridad una situación de *injusticia ambiental* entre las distintas clases sociales, fenómeno que implica en la distribución no ecuánime de la vegetación a través de los barrios, lo que se refleja en peores condiciones de vida (PEDLOWSKI, et al., 2003; PERKINS, et al., 2004). Se trata de un fenómeno común en las urbes brasileñas. En la ciudad de São Paulo por ejemplo, Lombardo (1985), al estudiar la geografía de las islas de calor, observó que el acceso a la vegetación es menor cuanto más pobre sea el barrio. La misma situación se puede observar en otras ciudades, como Ribeirão Preto (GUZZO, 1999). También en otros países acentuadamente desiguales, como África del Sur, iniquidades en el acceso a la vegetación caracterizan las ciudades (LUBBE, et al., 2010).

Efectivamente, la desigualdad en el acceso a la flora y sus beneficios es incluso más grave en el Jardim Universal, una vez que, diferentemente del barrio Zona 02, donde hay dos parques próximos, no existe allí ninguna área verde. No se trata meramente de una cuestión estética: varios estudios correlacionan barrios abundantemente vegetados a una menor incidencia de diversos tipos de enfermedades, como las respiratorias (TAKANO, et al., 2002; TZOULAS, et al., 2007).

En Brasil, la seguridad alimentaria es una cuestión trans-social. Según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011) menos de 10% de los brasileños con 10 años o más consumen diariamente los 400 gramos de frutas y hortalizas recomendados pela Organización Mundial de la Salud. Estudios epidemiológicos indican que el consumo abundante de frutas y verduras está asociado a bajas incidencias de varios tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas relacionadas a vejez, y enfermedades oculares, como la catarata (PADOVANI, 2003).

En este sentido, una importante función de los patios, que enlaza la biología de la conservación y la seguridad alimentaria, es la manutención de variedades de árboles frutales y otras especies de carácter alimenticio que no son cultivadas por la agricultura industrial. Esas especies y variedades frecuentemente poseen alelos raros (formas alternativas de un mismo gene) (NEGRI, 2003), hecho que justifica aun más la conservación de la agrobiodiversidad *in vivo* en los patios. Efectivamente, patios urbanos son importantes sitios de agrobiodiversidad (SIVIERO, et al., 2011), y su manutención es fundamental para la obtención de nuevas variedades de cultivos más adaptables a los cambios ambientales globales (GALLUZZI, et al., 2010).

4 CONSIDERACIONES FINALES

En Brasil los *patios* suponen centenares de hectáreas en las ciudades, espacios disponibles para recibir la vegetación que contribuya a una mayor seguridad alimentaria y calidad de vida de los ciudadanos. Los patios pueden además apoyar la conservación ex-situ, albergando especies en peligro de extinción como es el caso de *Araucaria angustifolia*, especie críticamente amenazada de extinción y cuyas semillas son muy apreciadas en la cultura alimentaria del sur de Brasil. A pesar de su potencial, los *patios* son invisibles a las autoridades municipales. No existe en las ciudades de la región metropolitana de Maringá legislación específica, ni datos sistematizados que permitan la planificación y gestión para el incremento de la vegetación en esos espacios – nuestro estudio ha sido pionero en el objetivo de dibujarse un cuadro de la diversidad vegetal en patios de diferentes clases sociales, en la RMM.

Hay espacio para un *continuum* de patios vegetados a lo largo del gradiente social investigado. Hecho inusual en las periferias pobres de las ciudades brasileñas, caracterizadas por una considerable escasez de suelo (ANGEOLETTO, 2008; ANGEOLETTO, 2012), los patios del barrio Jardim Universal son peculiares por presentaren áreas medias no pavimentadas que ultrapasan los 100 m². Para la mayor parte de las familias urbanas pobres del planeta, la escasez de suelo es el principal obstáculo para el establecimiento de patios abundantemente vegetados (MITCHELL;

HANSTAD, 2004), y plantíos de árboles en sus patios podrían disminuir el estado de injusticia ambiental en que se encuentran los vecinos del Jardim Universal. Esos plantíos podrían también representar un refuerzo a la seguridad alimentaria, o bien a los vecinos más pobres, o bien a los de clase media alta. Como hemos observado, la inseguridad alimentaria en Brasil es una cuestión trans-social.

Los patios del Jardim Universal son la única posibilidad de introducción de áreas verdes, a través de plantíos de árboles. Como hemos demostrado, su potencial de plantíos es elevado – se podrían plantar en los patios del barrio aproximadamente 4.300 árboles. En el barrio Zona 02 el potencial de plantíos es aun más elevado – se podrían introducir en sus patios circa 12.000 árboles.

Plantíos de árboles son la mejor manera de aumentarse la abundancia de una amplia gama de taxones de invertebrados y vertebrados en patios urbanos (SMITH, et al., 2006a; LORAM, et al., 2008). Además, en los árboles, la fauna silvestre está más protegida contra la depredación por animales domésticos, como *Felis catus* (BAKER, et al., 2005).

En este sentido, abogamos la necesidad de una planificación que contemple el eventual incremento del área construida de las viviendas, en paralelo al mantenimiento del área disponible para plantíos, principalmente de especies arbóreas. Esto se podría alcanzar, por ejemplo, a través de la *verticalización* de las viviendas aliada a la introducción de árboles en los *patios*, en proyectos conducidos por los ingenieros, arquitectos y biólogos de las municipalidades.

5 AGRADECIMIENTOS

A los agricultores urbanos Gizele Cezar Martins, Sonia Maria Essy, Antonio Angeoletto y Maria Helena Stern Soares Angeoletto, por el fecundo intercambio de ideas respecto a la flora de patios, y al doctor Marciano Lopes y Silva (*in memoriam*), por su decisivo apoyo a nuestros estudios sobre biodiversidad urbana. Asimismo agradecemos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno español, por la financiación al *Proyecto Ecología Urbana en Regiones Metropolitanas de Brasil: Paisaje, Calidad de Vida y Desarrollo Humano* [Plan Nacional de I+D+i (CSO2009-12689)].

REFERENCIAS

ANGEOLETTO, F. **Pelos quintais de Sarandi**: ecologia urbana e planejamento ambiental. Maringá, Brasil: Ed. da EDUEM, 2008.

ANGEOLETTO, F. **Planeta Ciudad**: ecología urbana y planificación de ciudades medias de Brasil. 2012. Tesis doctoral. (Doctorado en Ecología y Medio Ambiente) - Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2012.

BAKER, P.J.; BENTLEY, A.J.; ANSELL, R.J. et al. Impact of predation by domestic cats *Felis catus* in an urban area. **Mammal Review**, v. 35, p. 302–312, 2005

CARVALHO, E. Exclusão social e crescimento das cidades médias brasileiras. **Scripta Nova – Revista Eletrônica de Geografia y Ciencias Sociales**, v. 6, n. 146, 2003

CHAPIN III, F.S.; ZAVALA, E.S.; EVINER, V.T. et al. Consequences of changing biodiversity. **Nature** 405: 234-242, 2000.

DANIELS G.D.; KIRKPATRICK, J.B. Comparing the characteristics of front and back domestic gardens in Hobart, Tasmania, Austrália. **Landscape and Urban Planning**, v. 78, p. 344–352, 2006.

DAVIES, Z.G.; FULLER, R.A.; LORAM, A. A national scale inventory of resource provision for biodiversity within domestic gardens. **Biological Conservation**, v. 142, p. 761– 771, 2009.

DOW, K. Social dimensions of gradients in urban ecosystems. **Urban Ecosystems**, v. 4, p. 255–275, 2000.

FLORENTINO, A.T.N.; ARAÚJO, E.L.; ALBUQUERQUE, U.P. Contribuição de patios agroflorestais na conservação de plantas da caatinga, município de Caruaru, PE, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 21, n. 1, p. 37-47, 2007.

GALLUZZI, G.; EYZAGUIRRE, P.; NEGRI, V. Home gardens: neglected hotspots of agro-biodiversity and cultural diversity. **Biodiversity & Conservation**, v. 19, n. 13, p. 3635-3654, 2010.

GASTON, K.J.; WARREN, P.H.; THOMPSON, K. et al. Urban domestic gardens (IV): the extent of the resource and its associated features. **Biodiversity and Conservation**, v. 14, p. 3327–3349, 2005.

GODDARD, M.A.; DOUGILL, A.J. BENTON, T.G. Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments. **Trends in Ecology and Evolution**, v. 25, p. 90-98, 2010.

GONZÁLEZ-GARCÍA, A.; GÓMEZ-SAL, A. Private Urban Greenspaces or “Patios” as a Key Element in the Urban Ecology of Tropical Central America. **Human Ecology**, v. 36, p. 291–300, 2008.

GRIMM, N.B.; GROVE, J.M.; PICKETT S.T.A. et al. Integrated approaches to long-term studies of urban ecological systems. **BioScience**, v. 50, p. 571-584, 2000.

GROVE, J.M.; TROY, A.R.; O’NEIL-DUNNE, J.P.M. et al. Characterization of households and its implications for the vegetation of urban ecosystems. **Ecosystems**, v. 9, p. 578–597, 2006.

GUZZO, P. **Estudo dos espaços livres de uso público da cidade de Ribeirão Preto/SP, com detalhamento da cobertura vegetal e áreas verdes de dois setores urbanos**. 1999. Dissertação (Mestrado em Geociências e Meio Ambiente) - Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, Brasil, 1999.

IBGE. **Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil**. Rio de Janeiro, Brasil: IBGE, 2011.

IPEA. **Comunicados do IPEA, nº 68: análise preliminar dos dados do Censo 2010**. Brasília, Brasil: IPEA, 2011.

LOMBARDO, M. A. **Ilha de calor nas Metrópoles: o exemplo de São Paulo**. São Paulo, Brasil: Hucitec, 1985.

LORAM, A.; TRATALOS, J.; WARREN, P.H. et al. Urban domestic gardens (X): the extent & structure of the resource in five major cities. **Landscape Ecology**, v. 22, p. 601–615, 2007.

LORAM, A.; WARREN, P.H.; GASTON, K.J. Urban Domestic Gardens (XIV): The Characteristics of Gardens in Five Cities. **Environmental Management**, v. 42, p. 361–376, 2008.

LUBBE, C.S.; SIEBERT, S.J.; CILLIERS, S.S. Political legacy of South Africa affects the plant diversity patterns of urban domestic gardens along a socio-economic gradient. **Scientific Research and Essays**, v. 5, n. 19, p. 2900-2910, 2010.

MARCO, A.; DUTOIT, T.; DESCHAMPS-COTIM, M. et al. Gardens in urbanizing rural areas reveal an unexpected floral diversity related to housing density. **Comptes Rendus Biologies**, v. 331, n. 6, p. 452–465, 2008.

MCDONNELL, M.J.; HAHS, A.K. The use of gradient analysis studies in advancing our understanding of the ecology of urbanized landscapes: current status and future directions. **Landscape Ecology**, v. 23, p. 1143-1155, 2008.

MITCHELL, R.; HANSTAD, T. **Small Homegardens Plots and Sustainable Livelihoods for the Poor**. FAO LSP WP 11, Access to Natural Resources Sub-Programme, 2004.

NEGRI, V. Landraces in central Italy: where and why they are conserved and perspectives for their on-farm conservation. **Genetic Resources and Crop Evolution**, v. 50, p. 871–885, 2003.

PADOVANI, R.M. 2003. **Disponibilidade de carotenóides em relação à energia e proteínas nos domicílios de famílias das regiões metropolitanas brasileiras**. Dissertação (Mestrado em Alimentos e Nutrição) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil, 2003.

PEDLOWSKI, M.A.; SILVA, V.A.; ADELL J.J. et al. Urban forest and environmental inequality in Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brazil. **Urban Ecosystems**, v. 6, p. 9-20, 2003.

PERKINS, H.A.; HEYNEN, N.; WILSON, J. Inequitable access to urban reforestation: the impact of urban political economy on housing tenure and urban forests **Cities**, v. 21, n. 4, p. 291–299, 2004.

PICKETT, S.T.A. Integrated urban ecosystem research. **Urban Ecosystems**, v. 1, p. 183–184, 1997.

PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. **Anuario PNUMA: temas emergentes en nuestro medio ambiente global**. Nairobi, Kenya: PNUMA. 2011.

ROBBINS, P.; POLDERMAN, A.; BIRKENHOLTZ, T. Lawns and Toxins: An Ecology of the City. **Cities**, v. 18, n. 6, p. 369–380, 2001

ROSENZWEIG, M.L. Loss of speciation rate will impoverish future diversity. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 98, n. 10, p. 5404–5410, 2001

SANTOS, C. **Estatística descritiva: manual de auto-aprendizagem**. Lisboa, Portugal: Sílabo. 2007.

SIVIERO, A.; DELUNARDO, T.A.; HAVERROTH, M. et al. Cultivo de espécies alimentares de Rio Branco, Acre, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 25, n. 3, p. 549–556, 2011.

SMITH, R.M.; THOMPSON, K.; HODGSON, J.G. et al. Urban domestic gardens (IX): Composition and richness of the vascular plant flora, and implications for native biodiversity. **Biological Conservation**, v. 129, p. 321–322, 2006a.

SMITH, R.M.; WARREN, P.H.; THOMPSON, K. et al. Urban domestic gardens (VI): environmental correlates of invertebrate species richness. **Biodiversity and Conservation**, v. 15, p. 2415–2438, 2006b.

TAKANO, T.; NAKAMURA, K.; WATANABE, M. Urban residential environments and senior citizens' longevity in mega-city areas: the importance of walkable green space. **Journal of Epidemiology & Community Health**, v. 56, n. 12, p. 913–916, 2002.

THE ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. **Botanical Journal of the Linnean Society**, v. 161, p. 105–121, 2009.

THOMPSON, K.; HODGSON, J.G.; SMITH, R.M. et al. Urban domestic gardens (III): Composition and diversity of lawn floras. **Journal of Vegetation Science**, v. 15, p. 373-378, 2004.

THOMPSON, K.; COLSELL, S.; CARPENTER, J. et al. Urban domestic gardens (VII): a preliminary survey of soil seed banks. **Seed Science Research**, v. 15, p. 133-141, 2005.

TZOULAS, K.; KORPELA, K.; VENN, S. et al. Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. **Landscape and Urban Planning**, v. 81, p. 167-178, 2007.

UNFPA. **Estado de la Población Mundial 2007**. New York, USA: United Nations Population Fund, 2007.

VITOUSEK, P.M. Beyond global warming: ecology and global change. **Ecology**, v. 75, p. 1861-1876, 1994.

Recebido em: 08 de agosto de 2014

Aceito em: 01 de dezembro de 2014